




Chinese Surgery


Vol. 4











外科圖說卷四

華亭 高文晉梅溪氏輯

男 鼎玉味卿氏校

痔漏總論

痔漏一證。方書以肛邊腫核者爲牡痔。有孔者爲牝痔。癢而痛者爲脈痔。有寒熱者爲腸痔。出血者爲血痔。東垣立濕熱風燥四治。以秦艽蒼朮湯治腸頭結之濕爛也。當歸郁李仁湯理癢而兼痛之風也。涼血湯治大便閉結之燥與火也。丹溪專以補陰涼血爲主。其意甘寒可以息風。滋陰必能除燥也。彙叅先哲。

似無餘蘊。但病有兼因。法無一定。不得不稍加蛇足。以完全璧。至若氣血留滯者。通補可投。膏粱蘊熱者。清疎爲貴。有核燥潤兼投。痛久須加攻絡。成漏者無分虛實。年多法用。培元。黑地黃治脾濕腎燥之要藥。天真丸補真虧精乏之靈丹。補中能升氣陷。歸脾善止血流。班龍丸功擅溫煦奇督。逍遙散藥力善調肝。強六君培脾胃。左歸救腎傷。至於濕熱下流。致害腸胃者。方法詳後。宜變通施治可也。

蓮子痔



狀如蓮子

通腸痔



其根生於
下臟出糞即

氣痔



感氣即下

漏痔



氣血衰敗
久勞淹臑
不曾洗淨

勾腸痔




其形遠
腸頭者

蓮花痔



形如蓮花

雞心痔



其形如
雞心

垂珠痔



其形垂
下如珠

貫煉痔



穿而貫
膿血

栗子痔



其形如
栗子

菱角痔




形如菱角

盤腸痔



盤腸而生

子母痔



一大一小

翻花痔



形如翻花
登廁卽出

鼠竅痔




形如鼠竅

雙頭痔



有兩頭

泊腸痔



緊泊肛
門者

血攻痔



卽血出

夫妻痔



一圓一長
即雌雄也

珊瑚痔



形如珊

脫肛痔



肛門脫
下痔漏

擔腸痔



其痔橫
在肛門

三迷痔



有三珠財
迷色迷酒
迷故多之

櫻桃痔



形如櫻桃

雌雄痔



酒色食毒
不慎此間
黑色

右諸痔名類不同其種則一何也皆由大腸傳道

以成風熱深而腎虛爲冷氣相攻飽食猪雞魚膾
燒酒醞酒生酒辛辣等味或登廁臟虛爲風邪所
襲六氣七情所感人生素不能飲酒亦患痔者臟
虛故也亦有父子相傳者母血父精而成腸風者
血痔之漸也速服涼血補劑少勞戒怒遠色忌口
斯能愈矣

法製枯藥法

信 一兩

白朮 二兩
爲末

飛丹 五錢

硃砂

五錢
臨時生川

巴豆

五粒
去殼

先將凡一兩半安於瓦盆中隨將信摻在

此覆上火熬枯取出爲末加硃砂末五錢和勻
碾細末如塵先用魚腥草煎湯洗淨每用少許點
上少頃黃水漸出一日夜三四次如無魚腥草或
茶藤花或野薔薇花紅白槿樹花代之或甘草湯
亦可

今用藥開於後

護肉藥

鬱金 五錢

黃連 五錢

白芨 三錢

右爲末用蜜水調稀先將此藥塗在痔四邊好肉
上却用薄紙貼定固濟了好肉方用痔藥點之

痔漏千金秘方

用牡蠣二兩煨過入地窰坑埋之去火氣爲細末
痔漏瘡若濕乾摻若乾以津調搽痔上

又秘方

砒霜

白色明淨者五錢

白礬

一兩二錢明淨者

黃丹

六錢水飛過二次焙乾

草烏頭

二錢爲末骨去皮生用

蝎稍

八个瓦上焙乾

右件用舊鐵杓或熟鐵銚先將炭燒鐵銚透紅放
冷揩拭淨將砒打碎如豆大將白礬燒令滾沸將
碎砒投礬內拌勻以文武火煨旋旋攪入草烏頭

稍黃丹同研末收放於小瓶內先將痔漏以
甘草湯或葱湯洗淨將生麻油調藥少許以鷺翎
掃藥在痔漏上日三次第一日第二日瘡內必出
黃水如膠其痔漸消看漏深淺就將薄綿紙裹猪
鬃三根先入在漏內試漏深淺就將藥紙撚之藥
插入漏內其藥紙撚久不取出如換藥紙撚方取
出再換新藥紙撚入漏內日三次蚤午晚用藥
俱要洗淨漏用藥三五日痔漏頭併瘡口俱黑色
然後不用紙撚藥其漏瘡根自落如漏不深入內
上用藥點搽如瘡紅活平復不收口方用生肌散

藥敷之立愈其瘡根永不再發矣

生肌長肉藥

血竭 五錢

龍骨 五錢

光粉 二兩

白芷 五錢

黃丹

三錢水飛炒

軟石膏 一錢

黃連 五錢

海螵蛸

一錢

黃栢

一兩

五倍子 一兩

右爲細末如瘡孔深用蘆管吹入裏面如瘡口淺止乾摻入內生肌平復不用

點痔藥

冰片

乳香

沒藥

龍膽

俱爲末用蝸牛一枚碎其底入前四末放盞口內

以銀簪滴汁痔上甚効 田螺代之亦可

痔漏藥

用銅杓內制牛黃末一分先炒微煙卽下硃末二錢候煙起再下白礬末九錢待滾乾取起仍入火微炒煨安地上出火毒爲末後入乳香辰砂沒藥冰片各一錢共爲極細末每用一錢許以稠糊調和隨漏孔大條子量深淺長短用之如瘡孔爛大止用津唾調之填入孔內待痔已潰動毒水自流如好肉生瘡卽以五黃膏護外如入錠時仍用唾調前藥末付在痔根上如痔根脫落摻生肌散并

多服蠟礬丸

生肌散

龍骨 煨

海螵蛸

赤石脂 各錢

乳香

沒藥

血竭

輕粉

雄黃 各五分

未出毛小鼠

二枚炙乾

各為末如塵臨用加水片少許

又生肌散

寒水石

煨一錢

龍骨

煨五分

乾胭脂

三分

輕粉

為細末乾摻新瘡加薄荷一分老瘡依此

辰砂錠子

久痔成漏

信 一錢

白凡 二錢

蜜陀僧 五分

辰砂 五分

先研信細入磁盆中次用凡銀信上煙盡爲度再將蜜陀僧辰砂研細白麵一些和作尖錠子頑漏納瘡口腐去敗肉方可生肌

盤腸通腸痔散

痔在內用此敷之痔頭頂自出以前藥枯之

磁石 一錢

枯凡 五分

白乾薑 五分

草烏尖 三枚

右爲末葱汁調敷

痔腫者

用殼木鱉五倍爲末蜜水調敷

諸痔

用蜈蚣五枚搗碎水銀一錢射香三厘水片五厘
用銀簪蘸汁滴患上

痔漏

用團魚一枚扯出頭殺之取血卽將團魚頭燒灰
爲末血爲丸如棗核大諒痔之大小爲之入內

漏孔不合

用石楠葉煎湯放在桶內薰洗待湯過手就將漏
洗淨後將黃牛面前牙齒四枚裝在小瓶內用漆
屑燃之待白煙出爲度取出研末用津液蘸牙末

人漏花處
黃牛牙齒部
預製備

益氣清臟湯

人參

當歸

條芩

涼大腸

黃連

生地

赤芍藥

槐角

川芎

升麻

枳殼

寬大腸

秦艽

白朮

茯苓

甘草

水二鍾薑一片燈心甘根煎服

秦艽蒼朮湯

秦艽

一錢二分

當歸

一錢

澤瀉

防風

各三分

蒼朮 五分

桃仁 一錢研為泥

栝榔末 五分

大黃 一錢雖大便秘亦不宜多

皂莢 燒存性去皮一錢

黃栢

五分若大腸頭沉重者濕勝也更加之天氣大熱或燥熱喜冷者以意加之

右用桃仁栝皂三末另外餘作一服水煎去查加

三味末調勻再上火煎一二沸空心服之再食美

膳壓之不犯胃氣忌生冷硬物桃李梅杏菓品油

麵大料生薑胡椒之類第二服如前加木香末三

分

秦艽防風湯

痔漏每日大便時發疼痛如不疼痛非痔漏也

歸身

防風

白朮

陳皮

大黃

粉草

紅花 一錢

桃仁 三十枚

右作一服水煎空心服

秦艽羌活湯

痔漏成塊下垂疙瘡不任其痒惟雞心垂珠栗子

雙頭子母夫妻櫻桃下垂等痔

黃芪 各一錢

升麻

大柴胡

麻黃 各五分

羌活 一錢二分

細辛

紅花 各三分

防風 七分

藥本

秦艽當歸湯

痔漏大便結燥疼痛

秦艽

枳殼

當歸錢各一

桃仁

廿枚
去皮研

紅花三分

大黃四錢
煨

澤瀉

白朮

皂角仁

各五分

白水煎

當歸郁李仁湯

痔漏大便硬努大腸下垂多血苦痛不住

皂莢子

另末

郁李仁

麻子仁

各一分

秦艽

一錢五分

蒼朮

當歸

生地

各五分

枳實

七分

澤瀉

大黃

煨各三分

水二鍾煎成加皂莢子末切不可在風寒處

紅花桃仁湯

痔漏如勾腸蓮花菱角翻花珊瑚盤腸等痔年久
不愈治法當補北方瀉中央

生地

當歸

紅花

防風

猪苓

各五分

蒼朮

六分

澤瀉

八分

麻黃

二分

黃栢

一錢五分

木香

二分

白水煎

槐角子湯

外痔併漏根蒂落下然後服此藥除腹內之毒

槐角子

枳殼

黃芪

黃連

各五錢

薄荷 二錢

右咬咀作二服水二鍾煎至八分空心服

木香散 用藥後小便不通服此藥外痔不用

山梔子

木通

車前子

各三錢

淡竹葉

生地黄

黃芩

五錢

燈心

三十根

右咬咀每服四錢水一鍾半煎七分空心服

又方

痔貼藥之後惡毒未盡將槐米一兩炒黃色用水一鍾煎至七分加酒半鍾溫服之痔永不發矣

飲酒食熱物脾主大熱而助三焦氣盛火生土也
當瀉三焦若火熱退金得氣而反制木若木受制
則五蟲不生矣

蒼朮

四兩
去皮

地榆

皂莢子

各二兩
燒去性

澤瀉

枳實

秦艽

各二兩

末之搗飯丸每服五十丸溫酒米飲任下一方去
蒼朮加白朮

秦艽白朮丸

痔漏有膿血大便結燥腫硬疼痛

歸尾

枳實

澤瀉

白朮

各五錢

秦艽

桃仁製

皂角仁

燒存性
各一兩

地榆三兩

末之和桃仁泥煉蜜丸每百丸鹽湯下乾物壓之

槐角丸

槐角去梗為末入烏牛膽內掛透風處為末煉蜜

丸每服四十丸平胃散作湯下

腸風痔漏下血臟毒

大黃煨

桃仁各三分

當歸

檳榔

皂角仁

黃柏

荆芥

枳殼各五錢

蟬皮炙

黃連

秦艽

槐角各一兩

末之麴丸每五十丸食前白湯下鮮血下者加

毛蓮蓬灰

入腸內結燥疼痛

秦艽

枳殼

緊小者各一兩

桃仁

四錢

皂角仁

七錢

紅花

三分

澤瀉

白朮

黃柏

黃連

防風

當歸

各五錢

大黃

四錢

末之麵糊丸每六十丸白湯下

黃蠟丸

黃蠟四兩丸如桐子大月朔服一丸次日服二丸

三日服三丸漸加至月盡三十丸已後每日減一

丸至一丸止用酒送下輪流服之其瘡自痊一則

不必服矣

潤腸丸

當歸 五錢

枳殼 五錢

百草霜 一兩

大黃 五錢 紙包煨

右為細末糊丸桐子大每服三十丸白湯下

已破未破痔漏方

當歸

酒浸二宿 晒乾火焙

槐角子

麩皮炒

蝟皮

炒黃

地骨皮

淨晒乾

右為末各等分每服三錢五分空心溫米湯調五

更服之後畧睡一二刻少進米粥但宜乾餅一塊

少言語自早坐至午怡情適性方愈

方

用青荷葉燒灰爲末空心酒下三錢

又方

用金銀藤并花爲末每日酒下三錢

療痔神方

橡子粉

糯米粉

各二升爲末炒黃

每用二合滾湯調成餅飯上蒸熟空心食之

止氣收腸方

翻花內痔痔頭落腸不收服此藥外痔不用

黃芪二兩

白芷二兩

防風二兩

厚朴二兩

當歸

各二兩

川芎

一兩

蔓荊子

一兩

桔梗

一兩

木香

一兩

人參

三錢

肉桂

五錢

右爲細末

服三錢空心棗子湯調下日進三服

力壯其腸自收矣

豬肚膏

用雄豬肚一枚去垢淨入皂角刺一兩縛定兩頭

煮爛去藥空心任意喫又不可用鹽醬服三肚後

卽除根

一人患痔每日食海螺螯半斤因鹹以苦茶漱口

約及二斗又能清心寡慾痔即消矣痔乃臟火屬

陽海蝨乃性寒味鹹屬陰寒部火鹹能軟堅
又苦涼之味要又論之殆有也

小兒生痔空心服甘草膏白

孫真人射香膏

射香 二分

乳香 三分

血竭 四分

右爲一處以小紅棗煮去皮核肉和藥作餅依痔
大小放痔上用膏藥貼之痔內血水黃膠水流出
此痔患之毒也一二次卽愈

丹溪先生治漏瘡先用補藥以生氣血參芪歸朮
爲主大劑服之乃王道平平之劑外以附子末津

薰痔方

液作餅如錢厚放漏處艾灸之令微熱不可令痛
餅乾再易之其餅隨症大小爲之如困倦止之明
日再灸以肉平爲度仍前服補藥摻生肌長肉藥
用大雄雞宰去血在湯鍋內擣去毛取出雞將此
擣毛垢湯燒一二沸傾在淨桶內蓋定其氣少頃
將陽物放桶上坐緊薰之候湯溫洗痔淨拭乾隨
將蜈蚣一條碾末艾二錢和捻成條放馬桶內坐
薰之其痔焦熱尤妙新生者一兩次得愈久生者
五次得愈備加蜈蚣并艾薰後隨服益氣清臟湯

秦艽蒼朮湯調治之

洗痔方

馬蘭頭一斤皮硝四兩煎滾坐薰候湯溫洗之

又方

牛膝搗爛煎湯洗之 紅花子打碎煎湯洗之

又方

魚腥草煎湯洗之 白地菰煎湯洗之

洗痔國老湯

荊芥 一兩

甘草 一兩

藿香 五錢

右不拘多少煎湯溫洗洗一次用藥一次用藥之

後如大便閉塞用此外痔不用

又方

皮硝

鳳尾草

五倍子

韭菜子

等分

水一桶煎數沸放桶內坐之薰洗

脫肛痔

肺與大腸相爲表裏故肺臟蘊熱則肛閉結肺臟
虛寒則肛脫出此至當之論又有婦人產育過多
力盡血枯氣虛下陷及小兒久痢皆能使肛門突
出治之惟溫補肺臟滋榮腸胃久則能自收矣

血虛脫肛以四物湯爲主氣虛脫肛以參芪歸朮

生血熱以涼血為主四物湯加黃栢

參藥

乳香 五分

沒藥 三分

血竭 一錢

紅絨灰 五分

牛黃 五分

冰片 二分

珍珠 三分

孩兒茶 二分

象皮灰 三分

昇藥 三分

五倍 二分

右為極細末用後藥湯洗淨乾摻 須要避風

大人小兒摻藥

赤石脂

伏龍肝 各一兩

為末付腸頭上日三次

元大補湯

人參 三錢 升麻 五錢 白朮 二錢 土炒 白芍藥 一錢 酒炒

生地 一錢 姜汁煮 歸頭 二錢 黃芪 三錢

黃栢 知母 各一錢 俱鹽酒製 粉草 五分 炙

山藥 一錢 防風 錢 肉桂 五分 附子 七分

紅花 六分

右作一服水二鍾姜五片棗肉二枚煎服川芎不用因泄氣故止之 虛甚倍加參芪歸麻

虛人脫肛補中益氣湯

加黃栢知母蒼朮黃芩肛門痒加秦花桃仁大便閉塞加皂角仁

冬至前天道嚴寒其氣極沉極降之際況人身小
天地天在上人居中地在下豈不相應乎治之不
能卽奏功也陽生後日長一線陽漸長陰漸消矣
宜用灸法治之無不効者病人亦要戒氣少勞爲
上策擇晴明和暖吉日在不通風淨煖室中坐卧
取頂上旋毛巾百會穴以醬一七搽上艾灸三壯
隨服升元大補湯其肛漸收矣蓋百會爲一身之
樞紐大能升提下陷之氣故能奏功若冬至前不
可灸灸之何益次日再灸尾翠骨又灸臍中隨年
壯此法余用之甚効 諸痔漏亦治之

洗法

用生鐵五斤水二斗煎至五升出鐵洗之日三次
明日再易新鐵如前洗之

又方

枳殼

朴硝

川芎

當歸

桑枝

艾葉

各一兩

地榆

蒼朮

右煎湯洗之

但肛門收上十有一二須服補

劑調攝之其餘者漸漸乾息結痂偶遇喜樂之事
忽然脫落一黑圈噫此腸有餘乃截腸也

鼻痔

一名息肉



鼻居面中爲一身之血運而鼻孔爲肺之竅其氣上通於腦下行於肺若肺氣清氣血流通百病不生肺氣一有阻滯諸病生焉鼻孔中息肉名曰鼻痔皆由六氣七情所感而成若生上入眼名曰弩肉若生下入鼻中名曰息肉窒塞不通戒酒絕慾除煩惱戒憂愁內服煎劑外用點藥庶平復矣

通氣辛荑散

藁本 羌活 防風 薄荷 白芍 辛荑

升麻 甘草 川芎 當歸 生地 黃芩

連翹 桔梗 白芷 黃連 麥冬 柴胡

二鍾姜一片煎服

消痔散

蜜陀僧一錢

信一錢

白礬一錢

煨法陀僧礬四邊信居其中放在新瓦上煨煙盡
爲度入地下一夜出火毒取出加射香二分爲末
吹入鼻孔內時用手指揉鼻上下三百度其藥味
漸入痔易化水矣外用搜濕麵糊塞鼻孔使藥味
上行一日三四次點之其藥磁罐收貯

又方

仰臥時用白薑汁滴入鼻孔中即消

又方

雞內金

炙研末細如塵五錢

射香

三分

鴨嘴膽礬

二錢

銅綠

二錢

枯礬

一錢

右各研極細和勻磁罐收貯以蠟固口勿令山氣
臨用時點鼻中如前法夜間多點之其息肉十日
之內漸漸脫落或點藥揉鼻後出水不須憂慮此
息肉所化也如不能盡脫用鑷子徐徐擺動取出
亦可恐落後其根不能盡去再點藥四五日以絕
其根凡點藥務揉之

附鼻不聞香臭通氣湯

羌活

獨活

蒼朮

防風

薄荷

荊芥

升麻

乾葛

各一錢

甘草

五分

川椒

白芷

三分

冬天加麻黃一錢

水二鍾姜三片棗二枚葱白三寸煎

附酒齏鼻

四五年久藏糟茄露調硫黃末塗之四日後即消

連翹仁細茶各半爲末臨睡茶清送下三錢

附鼻衄

山砲燒灰爲末吹鼻內

或田螺水滴入

鼻內

耳鼻出血方

射香 一分

沉香 三分

白凡 一錢

糯米 五十粒

各爲細末麵糊丸如荳大絲綿包之如鼻中出血
塞於兩耳耳中出血塞於兩鼻如左耳出血塞右
鼻孔如右耳出血塞左鼻孔如左鼻孔出血塞右
耳孔如右鼻孔出血塞左耳孔卽愈

煎藥二神湯耳鼻皆可服

薛地


一兩

麥冬

一兩

水煎服之

鶴膝風



鶴膝風痢風鼓椎風之類也氣血相並而行週于
一身得寒則行遲而不及得熱則行速而太過內

傷七情外傷六淫則血氣之運或遲或速而病作
矣多因日久得熱已自騰沸後復感冒濕熱血受
邪鬱爲瘀滯不得運行所以作痛夜則痛甚行于
陰也治以辛溫監以辛涼流散寒濕而積熱得發
其血自行與氣相和其病乃止或因澁藥取効性
急作勞常享厚味感冒風雨腿腫則痛甚皆瘀血
流于經隧行久不治恐成偏枯以致膝腫筋縮大
痛兩足無力脚弱漸細髀脛枯槁拘攣不能屈伸
治宜祛風順氣補血壯筋養陰除濕則氣血通暢
自然愈矣

大防風湯

人參

一錢五分

羌活

獨活

甘草

牛膝

各一錢

白芍

熟地

白朮

防風

三錢

黃芪

杜仲

川芎

各二錢

蒼朮

一錢五分

附子

二錢

水二鍾姜五片棗肉二枚煎服飲好酒以助藥力

追風除濕圍藥

多年陳小粉

四兩炒焦色

乾姜

一兩

官桂

一兩

五倍

一兩

白芷

一兩

龜板

醋炙一兩

當歸

一兩

防風

一兩

白芨

三兩

烏藥

一兩

乳香

一兩

右爲細末用老姜汁醃醋各半葱汁一分蜜少許

火熬熱調藥乘通手捺四向空中出毒時用餘
汁熱潤之以助藥力

四妙丸

蒼朮

二兩

白芍

龜板

好酒炙酥各
二兩五錢

黃柏

五錢鹽
酒拌炒

右爲細末酒糊丸如桐子大每服六七十丸當歸
湯下酒亦可嚴寒加附子二錢

膝眼毒



此毒受在腎經膀胱不流氣血凝滯而濕熱攻于
膝眼結成毒也圍藥用鶴膝風藥敷之煎劑用木

香流氣飲

當歸

蒼朮

白芍

白朮

白芷

川芎

木香

牛膝

木瓜

烏藥

澤瀉

薄桂

紅花

五加皮

茯苓

歲靈仙

水二鍾姜七片葱白二根煎服

次服大防風湯 方在前

又方治膝腫

歸須

赤芍

桃仁

蒼朮

各一錢

黃芩

連翹

羌活

各五分

木通

紅花

甘草

生各三分

黃柏

七分


金銀藤

二錢

一人痰濕流注旁膝紅腫如腫毒相似脉浮滑用前

藥十二味加南星牛膝龍膽草

人面瘡



此症生于兩膝之上形如人面口眼俱全患人飽
則不動飢則口眼俱動俗呼爲冤業瘡膝蓋之間

然膝者筋之府屈伸不能而行則僂附筋將憊矣
此係皮肉堅硬之所且生疽毒則裏先潰後爛皮
膚攻作故成此形宜作善事解之須要眞誠懺悔
然後方可用藥初用流氣飲久不愈者服苦參丸
補腎水再用猪蹄藥湯洗之以生肌定痛散摻之
後用膏藥貼上

流氣飲 苦參丸 方具癰疽圖後

又方摻藥 貝母末用竹筒吹入瘡口內數日成痂
而愈

肺疽

骨槽疽



肫疽腫高而硬俗言此疽堅硬無膿殊不知其因
成膿在內一時不能出皮膚須用內托發出方可
用針刺破骨槽疽生于膝蓋上并腳趺上腕其痛
時如刀割其痒似蟲鑽急用艾灸疽上三五壯便
貼乳香萬應膏更服黃凡丸

治法同附骨疽

脚手發背



此症因心經有熱行履高低傷于足跌血聚成疽
治法同冷漏濕毒流注

加味流氣飲

治足上

川芎

麻黃

甘草

肉桂

乾姜

半夏

茯苓

枳殼

白芷

厚朴

芍藥

陳皮

蒼朮

姜三片水煎服

木瓜栝榔散

治足上

栝榔

木瓜

紫蘇

陳皮

甘草

木香

當歸

赤芍

再服蠟凡丸

羌活散

治手上

羌活

獨活

前胡

荊芥

甘草

烏藥

桔梗

薄荷

升麻

當歸

歲靈仙



此症生于手陽明之間初如粟漸長如赤豆其痛不可忍漸長大如楊梅之狀血不出亦不生膿毒從經絡流于遍身有此疾者宜當謹防不可視爲輕疾昔日山東唐世民感此醫者云此疽生爲奇相恐是惡毒世民笑而言曰吾乃識字人天賜與吾爲筆架後及二月遍身攻串其疽只口內出臭黃血水三五碗出水不至十日其亡矣後待洗浴停屍衆人持起遍體俱爛皮肉盡落今有此疾者宜仔細推情施治之宜用治疔之法加減行之

圖方論

手心毒
與手背
毒同治



此毒右手受在陰火太陽陽明氣血流於左足厥
陰經左手毒在心火太陽流於右足太陰陽明土
復生流于五行子母更相生養或因喜怒憂思寒

凝氣血阻滯不通結聚成毒當用定痛解毒之劑

紫蘇

芍藥

甘草

桔梗

枳殼

烏藥

白芷

防風

羌活

獨活

川芎

茯苓

黃芩

薄桂

乳香

威靈仙

右水姜三片煎服

后用內托流氣飲

人參

木香

乳香

當歸

川芎

黃芪

芍藥

防風

甘草

厚朴

枳殼

桔梗

烏藥

白芷

檳榔

紫蘇

姜三片棗一枚煎服外用金箍散敷之



此毒受在掌后因心經風寒喜怒驚風痰盛血不

流通結成此毒當用定痛敗毒散內托清氣飲或透手心或透腕外再用三香內托散治之

定痛敗毒散

白芍

白芷

乳香 末

桔梗

枳殼

防風

當歸

羌活

茯苓

甘草

薄桂

靈仙

木通

金銀花

姜三棗一煎服

夏天加黃芩

內托清氣飲

人參

黃芪

紫蘇

桔梗

金銀花

枳殼

青皮

甘草

厚朴

川芎

防風

天花粉

木香

羌活

當歸

芍藥

煎同前



此毒生于左肋下三指初起如痞日漸長大如碗
卽時就成水邊皮週圍攻結成膿形如蠱脹肚無
青筋而臍不凸只是癰脹便服二十四味流氣飲

猪苓

茯苓

霍香

砂仁

桔梗

枳實

厚朴

澤瀉

陳皮

紫蘇

當歸

青皮

香附

枳殼

赤茯苓

檳榔

木瓜

川芎

赤芍

黃芪

甘草

肉桂

木香

肉蔻

水煎空心服只可一服不可再服

然後用

內托散

桔梗

厚朴

白芷

防風

人參

黃芪

香附

陳皮

川芎

甘草

官桂

當歸

赤芍

金銀花

或加木香 行藥用賜癰方

蜈蚣三串



蜈蚣三串上下三種因受濕毒傷于膚氣血傷于
腎怒氣傷心而瘀血滯氣相搏故成此串毒也用

流氣飲

紫蘇

桔梗

枳殼

烏藥

甘草

芍藥

白芷

川芎

防風

厚朴

木瓜

香附

官桂

川棟子

水二鍾姜三片棗一枚不拘時服

三香內托散

人參

黃芪

當歸

川芎

芍藥

甘草

乳香

烏藥

防風

官桂

厚朴

桔梗

姜三片棗一枚水煎溫服

又方

紫蘇

枳殼

桔梗

甘草

赤芍

防風

當歸

川芎

羌活

厚朴

茯苓

前胡

生地

白芷

姜三片棗一枚不拘時服

熱加

柴胡

陳皮

半夏

止痛降氣飲

芎藭

白芷

細辛

各一兩 僵蚕 五錢生用

右爲細末煉蜜丸每服一九清茶嚥化

治法同三串及諸癰疽

發膊



蓋肺乃少陽經多氣少血厥陰因少陽有相火亢
甚于厥陰皆由多慮勞神六氣七情相感預宜防
肌肉難長暴戾之藥勿輕用之

一人右膊外側生一結核身微寒熱易怒平居奉養
甚厚診其脉俱浮大弦數重按似瀉皆因憂慮傷
血時在初秋切勿輕視宜急補以防變症宜人參
一觔作膏和淡竹瀝服之方保無虞奈病家吝費
求他醫治之以十宣五香相間服之旬日后忽大
風拔木病者發熱神思不佳其核卽稍高大似有
膿狀外腫起紅線延至肩後趨背脊入左脇下不

痛肩背重急食欲嘔急服人參膏入川芎生姜汁
服盡三觔而安然瘡潰膿乾又以四物湯加入人參
白朮陳皮炙草生姜水煎服數劑而安此病生于
春令甚難療者幸生在秋不幸暴風大作激起木
中相火非人參川芎膏驟補何由得生也

人參

四兩

川芎

一兩

生姜

五錢

右剉片水四碗煎至一碗去渣重湯熬膏每次如
之臨服加竹瀝

但此症之發紅腫或如粟勿以小而忽之



遊丹者卽遍身丹毒也初發兩手青腫徹上下急
急痛若經一宿二宿腫氣遍身入心內腫卽死初
覺急治之宜服五香連翹湯木香流氣飲以金箍
散敷之宜用治疔之法治之



火赤瘡



火赤瘡者氣血虛殘邪毒攻發初生赤色燎漿走

徹成膿生泡黃水時出沾破皮膚或如火燒疼痛
須用清肌解毒消邪熱降肺火補腎水之劑治之

犀角

甘草

乾葛

山梔

黃連

黃芩

夏天倍加

白朮

粘子

歸須

川芎

赤芍

黃柏

知母

荊芥

薄荷

青皮

桔梗

蟬脫

石菖蒲

天花粉


清涼膏

黃連黃芩山梔薄荷甘草桔梗枳殼煎數

沸去渣加冰片射香各三分鵝毛掃上指日得愈

紫金錠水磨塗之

發背



發背之生積毒臟腑正氣盛淹留停緩元氣虛朝
輕夕重如發弓矢外小內大內托則生敗毒則斃
治法以參芪爲主一定之論百世不易凡癰發于
背廣一尺深可一寸雖潰至骨不穿膜不死此症
六氣七情或因飲食而感其毒積于脾肚之間用
藥先消脾肚中之毒內外夾攻斯無患矣

發背癰疽惡毒

人參

黃芪

當歸

白朮

各五

橘紅

一錢
五分

右剉水煎入竹瀝姜汁和勻服之如欲煎膏加參
芪等藥各四兩

腫瘍加當歸連翹羌活

潰瘍加芍藥川芎甘草

白芷

酒毒加酒炒黃連

氣加炒香附

痰加瓜蒌仁

發熱加酒炒黃芩

渴加麥冬天花粉

惡心加半夏生姜藿香

解毒加金銀花甘草節

瀉加蒼朮白朮俱土拌炒

在太陽上加羌活

在少陽上加柴胡

在陽明經上加鼠粘子白芷升麻

魚脊瘡



魚脊瘡者臟中積冷腎氣虛寒故虛熱得傳經絡
筋骨之間發動不知何處初生如疽癰破時黃水

流生白泡似魚脊若不速治肉爛膿流命亦難保
先服神功活命湯次用歸芪調榮湯或參芪內托
散

當歸

川芎

生地

白芍

連翹

黃柏

知母

茯苓

甘草

升麻

白朮

桔梗

黃芩

獨活

青皮

白芷

苦參

天花粉

體虛加參朮減苦參連翹

外用解毒潤肌散搽之或用金絲膏貼之

洗用猪蹄煎湯

或用地骨皮煎湯尤妙

散走流注發

卷四

手



大凡氣血不調經絡不通復感六氣七情故毒氣
乘風熱而走是也此症因風盛而生熱之症熱極
氣盛氣因熱之極而走於四散急宜疎風定熱則
氣自然而息若元氣盛初發者速以艾灸七壯四
圍敷藥內服二十四味流氣飲無不愈者若流注
于手脚腿者死無疑矣

妙貼散

白芷

錢五

南星

錢五

肉桂

錢五

蛤粉

錢五

五倍

兩一

芍藥

錢七

多年小粉

炒八兩
焦

白芨

兩四

右磨末每用生姜自然汁好醋蔥蜜搗汁和勻火

上熬熱調藥如糊敷四向空中出毒乾再用煎汗
潤之以助藥力

加減二十四味流氣飲

陳皮

半夏

升麻

乾葛

甘草

澤瀉

茯苓

蒼朮

厚朴

木香

羌活

獨活

防風

荆芥

薄荷

黃芩

川芎

當歸

生地

白芍

黃芪

青皮

木通

白芷

冬天加紫蘇大柴胡水二鍾姜五片葱白三根煎
熱服以衣覆患上出汗爲妙止可一服

參芪內托十宣散

人參一錢五分 黃芪二錢 陳皮八分 甘草三分 升麻一錢

茯苓一錢 白朮 澤瀉二錢 當歸二錢 川芎

生地 白芍 黃芩 天花粉 烏藥

前胡 黃柏 知母


冬天加桂 倘有餘內症因症加減全在活法施治

背發兩頭



此症兩頭小者四邊散攻乃因飲酒體虛之所致也而氣食相關合陰虛而成之氣虛而散所以開口而濶急服內消藥亦宜補陽也治法與發背肩癰同前方加減服之

腎俞發




腎俞之發屬陰人難知識因受暑濕并怒氣飲熱
酒而得之傷於內腎之間流毒在腎急用解內腎
之毒內外攻之若醫緩傷膜者難生矣切戒怒氣
行房稍或一犯決不可治

治法同發背癰疽而補腎加黃柏知母沒藥廣膠

對心發此症難治

爲癰疽者死



心者君主之官神明出焉恬澹虛無病安從來心
有怫鬱諸病生焉發于手足者皆由于心火故

于心乎此症乃對心發因心火盛而熱氣會生于
此處其毒愈盛急用疎導心火之藥解之用意調
處若合兵法方有生機必須戒性若一怒不能生
矣發于心之側者亦可治

黃連解毒湯

黃連

姜汁
拌炒

甘草

升麻

桔梗

茯苓

黃芩

酒
炒

山梔

當歸

川芎

白芍

生地

枳殼

玄參

天花粉

連翹

小柴胡

金銀花

燈心

臨服加犀角汁服四劑后宜加人參 護心散

蠟凡九日夜服之

連珠發



此疾若陰囊赤腫小便不通小腹脹痛此疽因色
慾過度及醉飽房事以傷腎水得此疾者必致成
串令人口乾身發寒熱百節皆疼治方于後

十奇散 治發背傷于腎者

桔梗

人參

歸身

天花粉

五味子

芍藥

烏藥

香附

枳殼

木香

囊腫加

川楝子

檳榔

百節疼痛加木瓜

牛膝

赤芍

寒熱加

柴胡

黃芩

酒煎散 治發背因毒內攻其毒與好肉一般平者

用手按之如牛頸之皮上有黃泡出腥水乃毒入
于肺若不速治卽死

當歸

穿山甲

炮

白芷

升麻

肉桂

木香

川芎

赤芍

甘草

酒煎服

或患處好肉四邊紅腫其色如火用磁鋒斫去惡
血卽用鷄子清調乳香末敷之時時用芭蕉根汁
潤之以助藥功



此疾若肉黑色青色中大陷四圍硬肉亦紫色風
毒氣傷于腠理可發出卽生不發出卽死此毒因
膏粱之味溫床厚被醉飽房事以致五臟積毒不
流積而爲癰則心神恍惚夜夢不安小便頻數大
便澹泄此疾串于左脇卽死治方于後

內托十宣散

人參

黃芪

白朮

當歸

白芍

厚朴

白芷

川芎

連翹

官桂

桔梗

防風

甘草

荊芥

金銀花

水二鍾煎八分食前連進十點

虛甚者加附子

心神恍惚夜夢不安加遠志辰砂酸棗仁

大便溏泄加黃連木香白朮土炒蒼朮

內陷不發加穿山甲乳羊角燒灰

小便頻數加薏苡仁益志

膿不透加歸須地蜈蚣炙赤芍藥

連服蠟凡九日進五服

膿將透便服排膿內補十宣散即內托散

加木香穿山甲 仍貼金絲膏

經體發



此毒因暑熱之時空心受其穢氣以致胃氣仍敗
則致嘔逆如若不治毒氣入內則難生矣急服乳
香托裏散再服五香連翹散蠟凡丸外貼金絲膏
內服忍冬酒一口三服忍冬酒方具前

連子發背



上中下三搭手受在五臟六府毒熱憂怒氣壅傷
于肺經結聚成毒此是惡症也當用腦疽發背癰
疽等藥治之

圍藥亦然

時進忍冬酒蠟凡

上中下三發背



此疽發于右胸中恐其毒氣奔入心大要用藥散
之付圍藥點截住不令攻心如在中道通于背皆
腫不可救也消者可療諸瘡癰痒皆屬于心以心
生血而行氣之痛諸瘡皆有敷藥就上下打大針
三四針為妙用前化毒消腫散千金內托散多加
參芪

圍藥

南星

草烏

木鱉

貝母

大蒜

另搗

白芨

五倍

已上為末

生姜

取汁

米醋

調付留口二三日夜即消盡矣常以醋潤之
護心散蠟凡九時刻不可缺

上中下三搭手




此圖乃三搭手之圖也。上搭手在肩井穴，中搭手在背脊中，下搭手在腰脊中。此三搭手之法，乃治一切風濕骨痛之聖藥也。凡患此症者，宜每日練習此法，自然能去風除濕，筋骨舒暢，百病不生。此法之妙，不可言喻。凡欲學此法者，宜先求明師傳授，不可自便。此圖乃明師所傳，不可不察也。

上發背受在陶道經主傷于肺肝心經驚鬱結聚
怒氣傷肝壅出背毒此乃惡毒症也先用敗毒流
氣飲次用護心托裏散后用內托流氣飲治之敗
毒流氣方在後又并護心托裏散流方于後
中發背受在神堂靈道經正心毒心血湧出不能
歸肝氣血壅在皆中損于肝經此乃惡症當用前
藥治之敗毒流氣飲方在後

下發背受在脾肝經絡凝滯于五臟傷于三經此
是三毒之症也先用敗毒流氣飲後用人參內托
散外用圍藥敷之

封臍毒

名衡



衝疽者生于腰腎也發背骨作瘡腫又名對臍
名歷腎主心流入腎囊三十日可刺其膿赤白色
者不死青黃紫色又兼謊語及見物者瘡發則肉
腎疼變爲渴者萬無一全也多服參芪內托散

加知母 黃柏 麥冬 以滋腎水

腰疽



此疽受在陰包氣穴傷于濕氣血不行流注經絡
此是毒症也當用發背藥治之三五日內宜灸七

壯即消

瘕注如纏袋形



所謂痰注者何來六氣七情所感痰不能流行結于一處伏于經絡之間而背為明堂月深日久結成囊窠內連于臟腑外隔于皮毛宜早治之其形或圓或歪或如米袋堅硬如石外用圍藥次服人參內托散四五十劑元氣充足方可下行劑大便秘積數升而愈

萬應黑虎膏

多年小粉

八兩 炒黑

五倍

四兩 炒黃

蛤粉

四兩

白芷

二兩

天花粉

二兩

乾姜

四兩

龜板

二兩 醋炙

白芨

五兩

南星

四兩

昆布

二兩

白芥子

二兩

肉桂

三兩

烏藥

二兩

右各爲細末和勻用生姜自然汁一碗好醋一碗
葱半觔搗爛加蜜三兩再搗取汁半碗三味和勻
火上熬熱調藥俟通手敷患上留一小洞出氣時
用熱餘汁潤之一日夜方可易之敷至一月方得
軟矣亦可下行劑

人參內托散

人參 二錢

白朮 二錢

陳皮 一錢

半夏

一錢五分

芥子

一錢

黃芪

一錢

茯苓

一錢

當歸

一錢五分

川芎

一錢

白芍

一錢

黃芩

一錢酒炒

蒼朮

一錢

香附

五分

麥冬

五分

枳實

一錢五分

黃連

五分

桔梗

一錢

青皮

八分

烏藥

一錢

天花粉

一錢五分

防風

七分

甘草

四分

升麻

一錢

厚朴

一錢姜汁拌炒

加減存乎人

右作一劑姜五片砂仁末五分煎臨服加淡竹瀝

姜汁半酒杯和服之服至百劑方愈

神仙救命丹

待硬處活動如綿煎劑服大半方可

下之否則無益有損

珍珠

一錢

射香

一錢

冰片

三分

膽星末

五錢

甘草末

一錢

枳實

一錢

蟾酥

六分

巴豆霜

五分

全蝎末

一錢

蛤粉

一錢

右各為細末和勻米粉糊為丸如桐子大每服三

錢空心或酒或蜜湯送下其痰從大便中出盡爲度如不行再服卽行以薄粥補之若不待其軟遂下行藥命亦難生病者須要拱聽醫師之戒清心寡慾戒惱免憂并忌油膩生冷蒜茄等物如瀉不止另又一方

甘草

七分

黃連

一分錢五分

蒼朮

炒二錢

白朮

二錢土炒

猪苓

澤瀉

一錢

車前子

炒芍

炒苓

茯苓

一錢五分


人參

蓮肉

右水二鍾姜三棗二煎服卽愈

又方 早晨頭一吊井華水冷飲一酒杯其瀉立止

暑疔



大抵疔瘡有十三種而有青黃赤白黑所以應五臟也復有暑疔火疔氣疔冷疔者皆以其時候緩急浮實之異但初發起或先后痛先寒后熱四肢拘急沉重強痛者得症便發寒熱瘡邊麻漸至半身大痛應心嘔逆自利足冷至膝四畔紫黑色皆爲重症惟麻子始末皆痒若症候寒熱與諸疔瘡同俱覺背強其痛甚者乃觸犯所致卽取枸杞根搗汁服之彌佳再狗屎白色者得雨露之功臭氣已去加枸杞根和勻絞取清汁服之尤良但有卒患喉痛心寒熱或腹痛惡寒發熱者當預防生此

疔症也凡疔瘡多生口邊頰內或舌上赤黑點點如珠慘痛應心者是也不卽治之日夜根長流入諸脉如箭入身不得動搖經久五六月后甚者毒氣入腹眼中見火神昏煩悶嘔吐恍惚如醉如痴不可療矣疔瘡有頭黑硬而凹者瘡頭白而腫實者瘡頭如豆塗色者瘡頭鮮紅色者瘡頭內有黑脉者瘡頭紅赤而浮虛者瘡頭如桅而黃者瘡頭如金箔者瘡頭如茱萸者瘡頭如石榴子者有初如風疹粉刺搔破入風則去黃水出其裏有赤黑脉而微腫者肉中突起如魚眼赤黑慘痛徹骨者

結久皆爲爛瘡瘡下深孔如大針穿物初生時突起疔痂故名疔瘡令人惡寒發熱四肢強直而牽痛一二日瘡便變色焦黑腫大光起根硬不可近犯之則痛甚則發于頭面手足骨節間者氣血之所聚會宜急治之有似灸瘡四邊泡漿者但疔瘡熟時膿水出瘡孔如蜂窠病易瘥也疔瘡惡症眼黃面青舌黑冷汗發渴脚冷至膝下不食自利瘡冷不痛嘔逆瘡不起發四畔不紅瘡邊麻木乾黑生刺瘡邊紫黑色慘痛應心眼中見火神昏煩悶神思恍惚猶如醉痴者皆難治也試以針刺患人

手足中指不痛者難治疔瘡初生時紅軟溫和忽
然頂陷黑謂之癰走此症危矣急服飛龍奪命丹
追疔奪命湯其疔發于太陽腮邊者名曰釘腦疔
十死一生內經以白疔發于右鼻赤疔發于舌根
黃疔發于口唇黑疔發于耳前青疔發于目下蓋
取五色以應五臟各有所屬部位而已然或肩或
腰或足發無定處如在頭面手足骨節間者甚急
拔疔要法

妙法傳于後世

來學貴乎心求

不可妄治以傷生

不可過時而難療

凡疔瘡之起多發于嘴唇上邊初如米大或粉刺
擠破入湯火風氣亦要變成疔瘡疔瘡者卽疔之
別名也先用葱白同飛龍奪命丹五粒和嚼爛熱
酒半碗過下以衣覆患上畧出汗爲妙上午服藥
下午卽將絕利磁鋒劃破瘡口十字卽摻飛龍奪
命末在內而外用蟾舌研爛蟾肚底皮貼之內服
追疔湯劑若發于鬚髮者卽剃去鬚髮如前法治
之此法靜夜細思試而行之百發百中活人多矣
焉敢自秘遂并梓行病人一月內無色慾者患處
平安無贅肉乃其徵也

此法余精思所得百發百中切勿輕視之夢麟謹述

追疔奪命湯 服之速效能內消腫

羌活

獨活

青皮

防風

倍用

黃連

天花粉

赤芍

細辛

蟬脫

僵蚕

桔梗

金銀花

歸稍

川芎

白芷

連翹

山梔仁

甘草節

在脚加木瓜牛膝薏苡仁 一方加澤蘭一錢生

姜十片葱三莖煎熱服以衣被覆之出汗爲妙

外用飛丹白凡火上熬和礞末鷄子清調敷之

又方 用螻蛄蟲搗爛敷瘡上能拔疔根

當歸散

當歸

川芎

赤芍

刪芥

乾葛

烏藥

白芷

獨活

升麻

羌活

青皮

蟬脫

甘草

防風

枳殼

紅花

蘇木

瘡疼加乳香沒藥

瘡熱不退加淡竹茹山梔仁

腫不退加甘草節降真香節

眼昏加川芎白芷荆芥防風蔓荊子

渴加天花粉乾葛麥冬

小便閉加滑石味車前子

右水二鍾烏豆十粒煎服病在上食后服病在下

食前服

茺蔚散

治急慢疔瘡

本草云益母草味辛甘微寒無毒搗其莖葉以傅
疔腫服其汁以使疔腫內消隨處有之多生背陰
地四方莖根對節生葉嗅之畧臭節間生紅白花
四五月採之陰乾

益母草一味燒存性爲末先以小鑱刀十字剖破
疔瘡根至痛處令出血次繞疔根出血捻盡惡血
拭乾以稻草心蘸益母草灰撚入瘡孔中遍傳到
底良久當有紫黑血捻出令盡拭乾再撚入前藥
見紅血則止一日夜三五度重者三日根爛出極

者一日半出瘡根盤腸根出卽瘡根起也針挑出之雖挑不出其根自爛無憂矣內服救生奪命丹如無則服忍冬酒日夜服之并服追疔奪命湯若得此症便發寒熱半身麻木嘔吐不食其痛應心者甚急三五日便死急用小刀割斷疔根出血令盡若有疔發于三四處只去先發爲要其餘卽無害矣如前治之若陽症形體壯者實者以鋒針刺瘡四邊多出血以洩毒氣針刺所屬經絡而瀉之暑濕忌風寒房事酒肉魚腥蒜椒辛辣油膩粘滑生冷狐臭息香射香湯火氣

又方用蒼茸草野菊花二味搗汁和酒服之微醉患處以衣覆之睡一時痛定熱除矣

又方魚腥草搗汁和酒服之查付患上

疔瘡頭陷碧綠色者不可用針刀出血畧挑開磨付入益母灰又搗益母汁服之更妙

又有日久潰爛者不可用針出血只以鑱刀割去腐肉以益母草灰付之

護心散 疔瘡煩燥作渴惡毒攻心

青靛 二兩

雄黃 五錢

射香 少許

蒼耳灰

右爲細末每服二錢蜜水調下

一疔瘡生根入腹者便死用磨針刀鐵漿水一碗絲
綿濾淨銀窩內煎三四沸服之病者須臾腸鳴行
利一二次甦醒方可

一疔瘡不破則毒入腸胃惟蟬殼極効以一兩爲末
蜜調下

拔疔散

面粉

射香

人耳中膜

各等分

右爲末葱涎搜膏連紙貼患處其瘡根盡拔出

凡疔瘡發于頭面上者切不可用冷藥敷之若敷
冷藥趕熱毒惡戾之氣入于喉間斷不能生矣

疔瘡有十三種

一曰麻子疔其狀肉起頭如黍米色稍黑四邊微赤多痒忌食麻子油及芝麻并着麻衣并入麻田中行走

二曰石疔其狀皮肉相連色如黑豆甚硬刺之不入肉微痛忌瓦礫磚石之屬

三曰雄疔其狀炮起頭黑靨四畔仰炮漿起有水出色黃大如錢孔形狀高厚

四曰雌疔其狀瘡稍黃向裏靨亦似灸瘡四面炮壔起心凹色赤如錢孔

五曰火疔其狀如湯火燒灼瘡頭黑靨四邊有烟漿

又如赤粟米者忌火燒烙

六曰爛疔其狀色稍黑有口斑瘡瘡中潰有膿水流
出瘡形大小如匙面者忌食熱物

七曰三十六疔其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起赤
色今日生一明日生二及至十餘若滿三十六藥
不能治未滿可治

八曰蛇眼疔其狀瘡頭黑皮浮生形如小豆狀似蛇
眼大身體硬

九曰鹽膚疔其狀大如匙面四邊皆赤有黑粟粒起
大忌食鹽

十曰水洗疔其狀大如錢形如錢孔瘡頭白裏黑腐
汁出中稠硬忌飲漿水并水洗

十一曰刀鎌疔其狀潤狹如薤葉狀長一寸左側肉
黑如燒烙忌刺及刀并鐵器

十二曰浮腫疔其狀瘡體員曲少許不長而狹如薤
葉大內黃外黑其黑處刺之不痛黃處刺之痛

十三曰牛狗疔其狀肉色炮起指不破已上十三種
初起瘡心先痒後痛先寒後熱定則寒多四肢沉
重心驚眼花嘔逆者難治惟麻子疔始末皆痒已
上諸疔切不可觸犯若觸犯之必難治者凡孝服

鷄犬月經婦人狐臭之類悉屏之須要戒怒寬懷
爲上策謹慎謹慎

五
方



青升者根在肝發起于目下如瘤癥色青如石使
人目昏無見恐悸睡卧不寧或生筋骨之間久則
令人目盲或舌強語澁或脫精此症不出一年病
危最急治療之方一宗于後

方用紫花草敷瘡上

黃弁



今人曰許廷吉...
人曰習...
...

黃疔者脾中受熱根于胃氣邪風發于唇齒齦之
邊初生色黃有水四邊麻木然發中有黃故令人
多食手足麻木涎出煩燥腹脹嗜睡不言者死未
者可治形如魚脂

赤疔



一名紅絲血箭疔

一名紅演兒

一名紫疥班

赤疔者根在心發起于舌下根所俱赤作痛舌硬不能言語恍惚煩渴飲水不竭小便不通者死未者可治七日可知禍至矣

內服救急丹

黃連解毒湯

連翹敗毒湯

馬蹄香搗碎加水取汁服之立愈

白疔



白疳者大腸虛熱根在肺起于右鼻初起如粟米
火根赤頭白或麻木或疼痛使人增寒頭重鼻口
乾咽喉燥不欲飲食如胸膈滿悶喘促昏睡者死
未者可治不過七日禍必至矣

用紫花草敷瘡上



黑痔者膀胱虛熱根在腎發于耳前狀如癰痕色
黑堅硬使人牙關緊急腰疼脚膝不仁不然頭疼
三日禍至矣 形似蕎麥皮 用紫花草敷瘡上
五疔者皆因喜怒憂思衝冒寒熱是以蓄其邪毒
浸潰其臟腑久而發爲疔瘡

芝麻疔



芝麻疔用黑雲膏

用紫花草敷瘡上

走注者

遍身疼不能轉動

服蠲毒流氣飲

蟾酥丸

氣方



氣方用勝金錠

服蟾酥丸

外用紫花草敷之

火疔

勝金錠

服蟾酥丸

紫花草

敷瘡上



火疔用勝金錠

服蟾酥丸

紫花草敷瘡上



且冷疔者高粱之變風濕餘毒天陰久冷攻于膝
下傳于足太陰經初生如米漸成潰爛其色如煤
敗血來侵骨肉損壞遂成大患經年骨節疼痛累
歲不能生肌先用艾葉蛇床子紫蘇稀荳蔻煎湯
洗之內服黃芪白朮蒼朮當歸白芍連翹生地之
藥外用隔紙膏貼之節勞內省亦可瘳矣

鐵粉散

黃丹

一兩

生鐵粉

二兩即針砂

射香

五分

輕粉

松香

五錢

右爲末清油調貼瘡口上立愈



春用黑雲膏

夏用蟾舌膏

秋用桐淚膏

冬用勝金錠

五種疔瘡用蟾酥丸

能治諸般惡毒疔瘡其效不

可盡述

珠砂

膽凡

各五錢

血竭

銅青

蝸牛

各一兩生用

雄黃

白凡

各一兩

輕粉

沒藥

蟾酥

各五錢

射香

少許

右十一味除珠砂蟾酥蝸牛三味將八味為末却

將蝸牛蟾酥研極爛入前藥合均再入珠砂一半

在內為丸如鷄頭大又將珠砂一半為衣每一丸

令病人先嚼葱白三寸吐在手心內裹藥熱酒一盞吞下重者行五里有汗出輕者車行三里有汗出立效服藥後用厚被蓋之以出邪汗

勝金錠

人言

雄黃

硃砂

輕粉

射香

共爲末用黃蠟溶化和藥成膏子水浸少時取出用時捏餅子如錢眼大用羊骨針撥開瘡口放藥在內用膏藥貼之仍用蟾酥丸

黑雲膏

蒼耳草連莖葉子俱用燒灰用臘月猪肝研爛成

膏用厚皮紙攤貼瘡上其根自出

蟾舌膏

用蝦蟇舌一箇研爛用紅絹片攤貼其根自出

蟾肚皮
代絹妙

桐淚膏

梧桐淚丸如赤豆大用羊骨針撥破瘡頭放藥在

內用乾麵圍四畔仍用太乙膏貼之又用紫花草

付上



W138
1856
v. 4

